Pharma ark

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES MÉDICAMENTS

WWW.FRANCEPARKINSON.FR
FACEBOOK.COM/CHAQUEPASESTUNECONQUETE
@FRANCEPARKINSON
YOUTUBE.COM/USER/PARKINSONFRANCE

Une initiative de l'Association France Parkinson, développée par Observia

FRANCE PARKINSON

observia

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MÉDICAMENTS ANTI-PARKINSONIENS 1/5

Levodopa

CLASSE	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES			PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES	COMMENTAIRES À DÉLIVRER AU PATIENT
	MÉDICAMENTS	RISQUES	CLASSIFICATION		
Levodopa (Associée à un inhibiteur de dopa-décarboxylase) • Modopar® • Sinemet® • Stalevo®	Neuroleptiques antiémétiques	Effets L-DOPA	Contre-indication Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux	**Effet « On-Off » Neuropsychiques** Confusion, somnolence, comportements addictifs...	Augmenter la posologie progressivement afin de limiter le risque de survenue des effets indésirables
	Réserpine	Effets L-DOPA	Contre-indication		Administrer pendant les repas, afin de limiter les effets indésirables digestifs (sous réserve que le neurologue ait délivré le même conseil) ou à prendre avant le repas si risque d'interaction avec l'absorption de protéines (alimentation)
	Tétrabénazine	Effets L-DOPA	Association déconseillée	**Digestifs** Nausées, vomissements	
	Neuroleptiques antipsychotiques (sauf Clozapine)	Antagonisme réciproque de la L-DOPA et des neuroleptiques	Association déconseillée	**Cardiovasculaire** hypotension, tachycardie	Déconseiller la conduite automobile Prévenir le médecin anesthésiste en cas d'intervention nécessitant une anesthésie générale
	Fer	Absorption intestinale de la L-DOPA	Précaution d'emploi Prise à distance conseillée		

WWW.FRANCEPARKINSON.FR

Pharma Park

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MÉDICAMENTS ANTI-PARKINSONIENS 2/5

FRANCE PARKINSON
WWW.FRANCEPARKINSON.FR

Agonistes dopaminergiques

CLASSE	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES			PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES	COMMENTAIRES À DÉLIVRER AU PATIENT
	MÉDICAMENTS	RISQUES	CLASSIFICATION		
Agonistes dopaminergiques **Dérivés de l'ergot de seigle :** **Bromocriptine :** • Parlodel® • Bromocriptine® **Lisuride :** • Dopergine® • Arolac® **Non ergotés :** **Piribédil :** • Trivastal® **Pramipexole :** • Sifrol® • Pramipexole® • Opryméa® **Ropinirole :** • Requip® • Ropinirole® **Autres :** **Apomorphine :** • Apokinon ® • Dopaceptin ® **Rotigotine :** • Neupro® **Amantadine :** • Mantadix®	Ondansétron	**Avec l'apomorphine :** hypotension sévère et perte de connaissance	Contre-indication	**Pour tous :** Similaire à la L-DOPA **Dérivés de l'ergot de seigle :** Fibrose péritonéale **Apomorphine :** Réaction cutanée au point d'injection	Éviter la conduite automobile Administrer pendant les repas (sous réserve que le neurologue ait délivré le même conseil) Surveiller la pression artérielle (surtout en début de traitement) Surveillance ophtalmologique régulière pour Pramipexole et Rotigotine **Apomorphine :** recommander la prise d'un antiémétique en début de traitement et varier les points d'injection **Rotigotine :** Retrait du dispositif en cas d'IRM **Amantadine :** éviter la prise après 17h (insomnie)
	Neuroleptiques antiémétiques	Antagonisme réciproque avec les neuroleptiques	Contre-indication Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux		
	Médicaments sédatifs, alcool	Effets confusionnels et sédatifs	Association déconseillée		
	Neuroleptiques antipsychotiques (sauf Clozapine)	Antagonisme réciproque avec les neuroleptiques	Association déconseillée		

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MÉDICAMENTS ANTI-PARKINSONIENS 3/5

Inhibiteurs de mono-amine-oxydase B

Pharma Park

FRANCE PARKINSON
WWW.FRANCEPARKINSON.FR

CLASSE	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES			PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES	COMMENTAIRES À DÉLIVRER AU PATIENT
	MÉDICAMENTS	RISQUES	CLASSIFICATION		
Inhibiteurs de mono-amine-oxydase B **Rasagiline :** • Azilect® **Sélégiline :** • Déprényl® • Sélégiline®	Neuroleptiques antiémétiques	Effets L-DOPA	Contre-indication Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux	Potentialisation des effets liés à la stimulation dopaminergique par la L-DOPA Effets cardiovasculaires Élévation des transaminases Troubles hématologiques	Surveiller les effets secondaires
	Bupropion	Risque de crises hypertensives	Contre-indication		
	IMAO irréversibles (y compris Oxazolidiones)	Risque de poussée hypertensive	Contre-indication		
	Péthidine	Manifestations d'excitation centrale évoquant un syndrome sérotoninergique : diarrhée, tachycardie, sueurs....	Contre-indication		
	Triptans	Risque d'hypertension artérielle, de vasoconstriction artérielle coronaire	Contre-indication		
	Neuroleptiques antipsychotiques (sauf Clozapine)	Antagonisme réciproque de la L-DOPA et des neuroleptiques	Association déconseillée		
	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique	Précaution d'emploi		
	L-DOPA	Augmentation du risque d'hypotension orthostatique	Précaution d'emploi		
	Tramadol	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique	Précaution d'emploi		

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MÉDICAMENTS ANTI-PARKINSONIENS 4/5

Inhibiteurs de catechol-o-methyl-transferase

WWW.FRANCEPARKINSON.FR

CLASSE	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES			PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES	COMMENTAIRES À DÉLIVRER AU PATIENT
	MÉDICAMENTS	RISQUES	CLASSIFICATION		
Inhibiteur de catechol-o-methyl-transferase **Entacapone :** • Comtan® **Tolcapone :** • Tasmar®	Neuroleptiques antiémétiques	Effets L-DOPA	Contre-indication Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux	Potentialisation des effets liés à la stimulation dopaminergique par la L-DOPA Dyskinésie **Effets digestifs** Atteintes hépatiques (potentiellement mortelles avec Tolcapone, d'où 2nd intention)	**Tolcapone :** contrôle de la fonction hépatique au cours du traitement. Surveillance du poids en cas de diarrhées
	IMAO irréversibles	Potentialisation des effets pharmacologiques (notamment vasopresseurs) par inhibition conjuguée de leur métabolisme	Contre-indication		
	Tétrabénazine	Effets L-DOPA	Association déconseillée		
	Neuroleptiques antipsychotiques (sauf Clozapine)	Antagonisme réciproque de la L-DOPA et des neuroleptiques	Association déconseillée		
	Fer (avec l'Entacapone uniquement)	Absorption intestinale de la L-DOPA	Précaution d'emploi Prise à distance conseillée		

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MÉDICAMENTS ANTI-PARKINSONIENS 5/5

Anticholinergiques

FRANCE PARKINSON
WWW.FRANCEPARKINSON.FR

CLASSE	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES			PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES
	MÉDICAMENTS	RISQUES	CLASSIFICATION	
Anticholinergiques **Bipéridène :** • Akinéton® **Tropatépine** • Lepticur® **Trihexyphénidyle :** • Artane® • Parkinane®	Médicaments affectant le système cholinergique (Anticholinestérasiques, antidépresseurs imipraminiques, Amantadine)	Antagonisme pharmacologique ou majoration des effets atropiniques	⚠ Association déconseillée	**Effets anticholinergiques :** • Rétention urinaire • Glaucome aigu • Sécheresse buccale • Constipation • Confusion • Excitation • Euphorie • Hallucination
	Neuroleptiques antiémétiques (Dompéridone, Métroclopramide)	Inhibition des effets sur la motricité gastro-intestinale	⚠ Association déconseillée	
	Antipsychotiques, antagonistes H1 de 1ère génération	Potentialisation des effets indésirables sédatifs et du risque de confusion mentale	⚠ Association déconseillée	
	Adénosine triphosphate (Striadyne®)	Majoration du risque d'effets indésirables cardiaques tachycardie arythmie	⚠ Association déconseillée	